


ZALECANY SCHEMAT



*W zależności od warunków pogodowych



Wskazówka

Dostępność

Pozostałości i oporność

Efektywność

Weterynaryjny produkt leczniczy **Calistrip® Biox** z dwuwodnym kwasem szczawiowym w składzie, wydawany jest **bez przepisu lekarza weterynarii** (OTC – ang. Over The Counter).


Odpowiednie zarządzanie przez kontrolowanie populacji *Varroa destructor* (czynnika wywołującego chorobę - warroza), pozwala na długotrwałe utrzymywanie równowagi fizjologicznej w ulu, co zapewnia wysoką efektywność rodziny pszczelej.

Aby uzyskać najlepszą skuteczność, **Calistrip® Biox** powinien być stosowany w okresie aktywności pszczoł i najlepiej w momencie braku czerwii lub przy jego minimalnej ilości.

Brak pozostałości w miodzie i wosku po stosowaniu leku **Calistrip® Biox**, przekłada się na mniejsze ryzyko powstawania oporności.

Zapraszamy na naszą witrynę www.calier.com.pl

ZAANGAŻOWANI W PSZCZELARSTWO



Calistrip® Biox został w całości opracowany i wyprodukowany w przedsiębiorstwie farmaceutycznym i pszczelarskim Calier w Hiszpanii.

Innowacyjne i jedyne tego typu przedsiębiorstwo w Europie, pracujące nad rozwiązaniami, które mają za zadanie zaspokoić potrzeby branży pszczelarskiej.

Zaangażowanie w pracę na rzecz pszczelarzy to zaangażowanie na rzecz bioróżnorodności, ponieważ szacuje się, że jedna trzecia światowej produkcji żywności zależy od pszczoł, kluczowych zapylaczy w łańcuchu pokarmowym.

W ramach tego zobowiązania Calier kontynuuje działania, wspierając Cele polityki ustanowionej przez **Organizację Narodów Zjednoczonych** - program na rzecz **Zrównoważonego Rozwoju 2030**, opracowując rozwiązania, które napędzają i przyczyniają się do realizacji koncepcji **Jedno Zdrowie** (ang. One Health).



3 DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA



12 ODPowiedzialna konsumpcja i produkcja



13 DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU



Zapoznaj się z pełną Charakterystyką weterynaryjnego produktu leczniczego.

C CALIER
www.calier.com.pl

CALISTRIP® BIOX

Naturalna metoda w pasku.

CALISTRIP® BIOX 6,44 g paski do zawieszania w ulu dla pszczoł miodnych to **pierwsze i jedyne** paski **organiczne** przeznaczone do **bezpośredniego kontaktu z pszczołami**, umożliwiające **wydajną rotację** i których **efektywność** jest **porównywalna** z kuracjami opartymi o weterynaryjne produkty lecznicze na bazie związków uzyskanych na drodze **syntezy chemicznej**. CALISTRIP® BIOX to produkt odpowiedni zarówno dla pszczelarstwa **tradycyjnego**, jak również **ekologicznego**.



Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

C CALIER

GŁÓWNE CECHY

JAK STOSOWAĆ CALISTrip® BIOX



Produkt

Środek roztaczobójczy, opracowany **do zwalczania zakażenia dręczem pszczelim**. Każdy pasek o masie 50,74 g zawiera 6,44 g kwasu szczawiowego dwuwodnego (co odpowiada 4,6 g kwasu szczawiowego).



Wygląd

Saszetka zawierająca **10 pasków z kwasem szczawiowym**, który działa **przez kontakt bezpośredni**, i oferuje **długotrwałe efekty**.



Dawkowanie

Wystarczy **2 paski na pojedynczą kurację jednego ula**.



Wskazania

Leczenie warrozy (*Varroa destructor*)
pszczoł miodnych (*Apis mellifera*).



Kuracja

Okres **6 tygodni**. Można stosować **kolejne kuracje w przypadku nawrotu zakażenia**, ale należy utrzymywać 1-miesięczne przerwy pomiędzy kuracjami.



Skuteczność

Skuteczność jest **porównywalna z kuracjami** opartymi o weterynaryjne produkty lecznicze na bazie innych związków uzyskanych **na drodze syntezy chemicznej**, stosowanymi w okresie bezczerwiowym.



Okres Karencji

0 dni dla miodu po zakończeniu leczenia. Nie należy zbierać miodu w trakcie 6 - tygodniowego okresu kuracji.

Calistrip® Biox można dostosować do każdego rodzaju ula dzięki podwójnemu systemowi mocowania i funkcji ustawiania w dwóch pozycjach.

Aby użyć produktu, wyjmij paski z saszetki, zdejmij folię ochronną pociągając za końcówkę, a następnie zegnij pasek wybierając pozycję najlepiej dopasowaną do ula.



Pozycja B dla ula Langstroth



OPEN OPEN OPEN



Pozycja A dla ula Dadant oraz Layens



Paski zawsze należy umieszczać w rodni gniazda między ramkami, ponieważ działają na zasadzie bezpośredniego kontaktu. W ten sposób ich zawartość zostaje zebrana przez pszczoły podczas czyszczenia, dzięki czemu wchodzi one w bezpośredni kontakt z substancją aktywną (kwas szczawiowy).



Dadant



Layens



Langstroth



Po zakończeniu kuracji należy usunąć paski i przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

